

APOYO DESDE FRANCIA

Afectada de Agreal [2007-03-07 00:47:25]

FRANCIA

ECNAR [2007-03-03 12:54:57]

En Francia también intentemos reunir las víctimas de este veneno y somos muy atentas al desarrollo de los juicios en Barcelona. Cuando Sanofi dice que no hay problemas en los otros países es mentira.

Animo a todas.

APOYO DESDE ITALIA

Afectada de Agreal [2007-03-07 00:50:38]

AGREAL-ESPAÑA

AGRADIL-ITALIA [2007-03-03 12:04:28]

INTERAZIONI:

Associazioni controindicate. Levodopa e agonisti dopaminergici: antagonismo reciproco degli effetti tra agonisti della dopamina e neurolettici. Neurolettici antipsicotici. Neurolettici antiemetici. Aumento degli effetti indesiderati neurologici e psicologici. Associazioni non raccomandate. Enorme prudenziale evitare l'associazione con farmaci che inducono iperprolattinemia. Alcol: l'alcol potenzia gli effetti sedativi di veralipride. Bevande alcoliche e farmaci contenenti alcol non sono raccomandati. Associazioni da considerare con attenzione. Farmaci depressori del SNC, quali derivati della morfina, antistaminici H1 sedanti, barbiturici, benzodiazepine, sedativi antidepressivi e ansiolitici, clonidina e derivati: aumento dell'effetto sedativo della veralipride.

POSOLOGIA E MODALITA' D'ASSUNZIONE:

Una capsula al giorno per un ciclo di 20 giorni, eventualmente ripetibile dopo una sospensione di 7-10 giorni, sotto controllo medico. La durata del trattamento deve essere limitata a 3 mesi. Il rapporto beneficio/rischio deve essere regolarmente rivalutato prima di iniziare un nuovo ciclo.

AGREAL DESDE ITALIA

Afectada de Agreal [2007-03-07 00:52:22]

AGREAL EN ITALIA

VERALIPRIDE-AGRADIL [2007-03-03 12:01:57]

Us placebo condotti in una popolazione di pazienti con demenza trattati con alcuni antipsicotici atipici è stato osservato un aumento di circa tre volte del rischio di eventi cerebrovascolari. Il meccanismo di tale aumento del rischio non è noto. Non può essere escluso un aumento del rischio per altri antipsicotici o in altre popolazioni di pazienti. Deve essere usato con cautela in pazienti con fattori di rischio per stroke. A causa del lattosio presente nella formulazione i soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi o malassorbimento di glucosio/galattosio non devono assumere questo medicinale.

AGRADIL-AGREAL ITALIA

Afectada de Agreal [2007-03-07 00:56:22]

ITALIA

AGRADIL--AGREAL [2007-03-03 11:55:14]

MECCANISMO D'AZIONE:

Antipsicotici

INDICAZIONI:

Trattamento delle vampate di calore nella sindrome menopausale.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Pazienti con tumori prolattino dipendenti quali prolattinomi ipofisari e cancro mammario. E' controindicato inoltre nelle galattorree, nella mastopatia fibrocistica, nelle displasie mammarie, nelle neoplasie mammarie in atto o sospette. Pazienti con feocromocitoma, accertato o presunto. L'impiego e' sconsigliato in pazienti con porfiria acuta in quanto la veralipride e' risultata porfirogenica in studi in vitro e nell'animale da esperimento. Associazione con levodopa e agonisti dopa minergici. Associazione con neurolettici antipsicotici e neurolettici antiemetici. Controindicato durante la gravidanza e l'allattamento non e' comunque pertinente in quanto tale prodotto trova la sua indicazione e terapeutica nel trattamento dei disturbi della sindrome menopausale.

EFFETTI INDESIDERATI:

Incremento del peso, sonnolenza. Iperprolattinemia e disordini correlati: galattorrea, amenorrea, ingrossamento/dolore del seno e disturbi del l'orgasmo. Veralipride puo' indurre galattorrea soprattutto nelle pazienti in cui sia ancora presente una secrezione endogena di estradiolo. Per tale motivo, veralipride non e' indicata durante la premenopausa ed e' necessario un controllo particolare in caso di precedenti neoplasie mammarie. Sintomi extrapiramidali precoci e disturbi correlati quali: parkinsonismo e sintomi correlati: tremore, rigidita', ipocinesia, ipertonia, ptialismo; discinesia precoce e distonia (torcicollo spasmodico, crisi oculogire, trisma); akatisia. Questi sintomi sono in genere reversibili dopo somministrazione di farmaci antiparkinson anticolinergici; si raccomanda tuttavia di interrompere definitivamente il trattamento con veralipride .

Sono stati riportati casi molto rari, generalmente dopo somministrazione a lungo termine, di discinesia tardiva, caratterizzata da movimenti ritmici, involontari, soprattutto della lingua e/o della faccia. In tal caso i farmaci antiparkinson anticolinergici sono inefficaci o possono determinare un aggravamento dei sintomi. In casi molto rari sono stati osservati sintomi da astinenza con o senza ansia, o sindromi depressive con o senza ansia all'interruzione del trattamento o nell'intervallo tra due cicli. In tale evenienza si consiglia di riprendere la terapia che deve essere ridotta progressivamente fino a definitiva sospensione. Effetti di classe: Sindrome Neurolettica Maligna. Allungamento dell'intervallo Q-T. Tali effetti, riportati in casi molto rari con altri neurolettici, non sono stati osservati durante il trattamento con veralipride.

MEJICO**Afectada de Agreal [2007-03-07 01:02:11]****MEXICO****VERALIPRIDA-3 [2007-03-03 11:34:57]****DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:**

Dosis: Ciclos de tratamiento de 20 días con una cápsula al día. Intercalar periodos de descanso de 10 días. Repetir esquema de tratamiento por 6 meses, a criterio del médico tratante.

Vía de administración: Oral.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):

En caso de sobredosis, puede incurrir discinesia localizada y generalizada. El tratamiento debe ser sintomático e implica la administración de agentes anticolinérgicos antiparkinsonianos.

PRESENTACION:

Caja con 20 cápsulas.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco y seco.

LEYENDAS DE PROTECCION:

Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica.

MEJICO**Afectada de Agreal [2007-03-07 01:04:17]****MEXICO****VERALIPRIDA-2 [2007-03-03 11:32:19]****CONTRAINDICACIONES:**

Debido a su efecto hiperprolactinéxico, este producto está contraindicado en pacientes con hiperprolactinemia no funcional (microadenoma y adenoma hipofisarios dependientes de la prolactina). En pacientes con feocromocitoma, se han señalado episodios de hipertensión severa durante el tratamiento con agentes antidopaminérgicos, incluyendo algunas benzamidas. Por lo tanto, no se recomienda prescribir este medicamento cuando se conoce o sospecha la presencia de un feocromocitoma.

En pacientes con antecedentes neoplásicos mamarios, se debe establecer una cuidadosa observación de la evolución mamaria.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA:

No se han planteado hasta ahora.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Raros casos de aumentos de peso, galactorrea, sedación y somnolencia. Casos excepcionales de discinesia neuromuscular y efectos secundarios extrapiramidales. Debe advertirse a las personas que conducen un vehículo y a los operarios de maquinaria, el riesgo de somnolencia durante el tratamiento con este medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO:

Las propiedades farmacocinéticas de la veraliprida y su unión limitada a las proteínas plasmáticas, son tales que no existe ninguna sospecha de interacciones medicamentosas. No se han señalado manifestaciones de interacciones con otros medicamentos.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se han reportado hasta la fecha.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

Ninguna a la fecha.

MEJICO

Afectada de Agreal [2007-03-07 01:05:31]

MEXICO

VERALIPRIDA-1 [2007-03-03 11:29:30]

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:

Cada cápsula contiene:

Veraliprida 100 mg

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Auxiliar en el tratamiento del síndrome climatérico y la menopausia.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:

Propiedades farmacocinéticas: La biodisponibilidad de la veraliprida en cápsulas es superior a 80%; la vida media de eliminación es de aproximadamente 10 horas, lo que justifica la prescripción de una sola dosis diaria sin riesgo de acumulación durante el tratamiento a largo plazo. La veraliprida, componente de VERALIGRAL* es sometida a un metabolismo muy limitado; su depuración total es de 775 ml/min y su depuración renal media es de 250 ml/minuto.

Propiedades farmacodinámicas: La veraliprida, constituyente de VERALIGRAL* es una benzamida sustituida. Los estudios farmacológicos han demostrado que veraliprida presenta una gran afinidad por los receptores dopaminérgicos D2. Sin embargo, difiere de los agentes antidopaminérgicos convencionales en que no induce catalepsia en animales y sólo reduce ligeramente la respuesta de los roedores.

Veraliprida ejerce efectos profundos sobre el mecanismo dopaminérgico de termorregulación mediante el bloqueo selectivo de los receptores dopaminérgicos de hipotálamo. Con la veraliprida se demostró una reducción de la LHRH en ratas hembras castradas. Estas propiedades explican el efecto de veraliprida sobre los bochornos asociados con la menopausia que ocurren a raíz de un trastorno de la termorregulación y de la fluctuación pulsátil de la LH. El efecto hiperprolactinéxico de la veraliprida también se debe al bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2. La administración de veraliprida, a mujeres posmenopáusicas con bochornos, reduce la temperatura central y los síntomas vasomotores.

BOGOTA –COLOMBIA

Afectada de Agreal [2007-03-07 01:06:50]

BOGOTA--COLOMBIA

AGREAL [2007-03-03 10:52:26]

Voy a cumplir 51 años. Hace ya 2 años que no me viene la menstruación. Todos mis exámenes hormonales han salido bien en ese sentido. Para los "supuestos calores" me mandaron AGREAL, pero el efecto que me hace es HORRIBLE: me siento con sueño, una bostezadera espantosa, incontrolable, unos deseo de "salir corriendo" y me siento mal.

CHIHUAHUA – MEJICO

Afectada de Agreal [2007-03-07 01:08:07]

ACLIMAFEL- VERALIPRIDA

[2007-03-03 02:42:24]

Hola. Yo escribo desde Chihuahua, México. Entre en Internet a buscar información sobre el Aclimafel porque desde que empecé a tomarlo me he sentido muy somnolienta y con grandes molestias en las piernas, mucho cansancio, etc.

CHILE

Afectada de Agreal [2007-03-07 01:09:13]

MARGARITA--CHILE

[2007-03-03 02:39:24]

Mi nombre es margarita y escribo de CHILE. Ayer por casualidad, al ver un canal español, me enteré de el daño que produce el medicamento AGREAL y entendí el motivo de la enfermedad de mi madre que tiene 70 años. Este año, a finales de Enero, tuvo síntomas como: dolores en la parte alta del estómago, temblores en las extremidades, decaimiento general, sudoración, problemas para respirar.

La llevamos a la clínica y le diagnosticaros una depresión severa. El cardiólogo le suspendió el medicamento que le había indicado la ginecóloga: el AGREAL.

General : APOYO DESDE FRANCIA

[Ver todos los mensajes](#)

[Discusión anterior](#) [Mensaje anterior](#) [Mensaje siguiente](#) [Discusión siguiente](#) 

[Nueva discusión](#)



Respuesta	 Recomendar	Mensaje 5 de 5 en la discusión
De:  roosee2005 en respuesta a Mensaje 4		Enviado: 21/09/2006 21:26
<p>Hola a todas ! Encore bravo pour votre manifestation !  J'espère qu'elle fera avancer les choses !! Merci pour toutes les femmes intoxiquées -  Amicalement Rosée </p>		

General : APOYO DESDE FRANCIA

[Ver todos los mensajes](#)

[Discusión anterior](#) [Mensaje anterior](#) [Mensaje siguiente](#) [Discusión siguiente](#) 

[Nueva discusión](#)



Respuesta	 Recomendar (1 recomendación hasta el momento)	Mensaje 1 de 5 en la discusión
De:  ecnar2 (Mensaje original)		Enviado: 21/09/2006 11:43
<p>Mañana durante la manifestación en Madrid les acompañaremos con todo nuestro corazón. Seguro que será un gran éxito. Bravo a todas por su tenacidad. Areal sigue comercializado aquí y no llegamos a movilizar a los medios. Intentamos reunirnos pero es muy difícil. Un beso especial ÁNIMO A TODAS Y POR FAVOR GRITEN TAMBIEN NUESTRA PENA Y NUESTRA RABIA. ECNAR Y TODAS LAS ENVENENADAS DE FRANCIA</p>		

General : AGREAL EN CHILE

[Ver todos los mensajes](#)

[Discusión anterior](#) [Mensaje anterior](#) [Mensaje siguiente](#) [Discusión siguiente](#) 

[Nueva discusión](#)

Respuesta	 Recomendar	Mensaje 1 de 1 en la discusión
De:  Darkmaximo_elmejor1 (Mensaje original)		Enviado: 11/04/2006 21:28
<p>hola soy Margarita Yañez de Chile, hija de una víctima del agreal. Me ha sido muy difícil lograr que me escuchen acá en mi país, y veo con horror como el agreal es recetado a diario a más y más mujeres. Yo investigué y en las 3 cadenas de farmacia más grandes de Chile es el medicamento más vendido para los síntomas de la menopausia con y sin receta .</p> <p>Yo me siento muy sola luchando contra el agreal, pero no me rendiré. Agradezco a los que me han mandado información y les pido más y más. Por favor, tengo que tener muchos argumentos para parar esto (TE AGRADEZCO EN ESPECIAL UN BESO).</p> <p>Estoy preparando una carpeta para un periodista de la RADIO AGRICULTURA de LOS ÁNGELES. Esta radio esta en todo CHILE, pero en mi ciudad el periodista LUIS RIQUELME PAYACAR me escuchó y me pidió mas datos, ya que él no se puede arriesgar.</p> <p>Gracias a todos y que dios nos ayude.</p>		

Esto demuestra que no solo en España hay afectadas, también hay en Perú y seguro que en muchos países más. Lo que ocurre es que no todo el mundo entra en Internet.