


PROSPECTO ESPAÑOL DEL MEDICAMENTO



INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFECTOS SECUNDARIOS

Este medicamento puede inducir una galactorrea, principalmente en las pacientes en las que la secreción endógena de estradiol no está suprimida (por esta razón, **AGREAL**[®] no está indicado durante la premenopausia).

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

La toxicidad experimental del medicamento es muy baja. Su parentesco químico con las benzamidas sustituidas puede hacer pensar que después de una absorción masiva del preparado, podrían aparecer crisis disquinéticas, localizadas o generalizadas, espontáneamente reversibles.

En caso de sobredosis ó ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono 91.562.04.20.

PRECAUCIONES

No procede.

PRESENTACION

Envase con 20 cápsulas

CON RECETA MEDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Fabricado por: SANOFI-SYNTHELABO, S.A. (Alcobendas - Madrid)

SANOFI-SYNTHELABO, S.A.

Avda. Litoral Mar, 12-14. 08005 Barcelona

sanofi~synthelabo

Texto revisado: Marzo 2000

X7N02C/0005